

## [NOTICE](#)

ANSM - Mis à jour le : 26/03/2008

### [Dénomination du médicament](#)

ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule

### [Encadré](#)

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### [Sommaire notice](#)

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule ?
3. COMMENT PRENDRE ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### [1. QU'EST-CE QUE ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?](#)

#### [Classe pharmacothérapeutique](#)

**VASCULOPROTECTEUR / MEDICAMENT AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES**

#### [Indications thérapeutiques](#)

Ce médicament est un veinotonique (*il augmente le tonus des veines*) et un vasculoprotecteur (*il augmente la résistance des vaisseaux sanguins*).

Ce médicament est préconisé dans les troubles de la circulation veineuse et de la crise hémorroïdaire.

## [2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule ?](#)

### [Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament](#)

Sans objet.

### [Contre-indications](#)

#### **Ne prenez jamais ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule:**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'antécédents d'allergie au rutoside ou à l'un des composants du médicament.

Ce médicament est généralement déconseillé pendant l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

### [Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales](#)

#### **Faites attention avec ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule:**

##### **Mises en gardes spéciales**

Attention! Ce médicament contient de l'alcool: le titre alcoolique de la solution est de 26 % soit 0,82 g d'alcool par ampoule.

##### **Précautions d'emploi**

Crise hémorroïdaire: si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

Troubles de la circulation veineuse: ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.

La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

En raison de la présence d'alcool, prévenez votre médecin en cas de maladie du foie, d'épilepsie, ou de grossesse

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

### [Interactions avec d'autres médicaments](#)

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### [Interactions avec les aliments et les boissons](#)

Sans objet.

[Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives](#)

Sans objet.

[Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement](#)

## **Grossesse et allaitement**

### **Grossesse**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

### **Allaitement**

En raison du passage dans le lait maternel de la coumarine, ce médicament est déconseillé pendant la période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Sportifs**

Sans objet.

[Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines](#)

Sans objet.

[Liste des excipients à effet notoire](#)

**Liste des excipients à effet notoire:** alcool.

[3. COMMENT PRENDRE ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule ?](#)

[Instructions pour un bon usage](#)

Sans objet.

[Posologie, Mode et/ou voie\(s\) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement](#)

### **Posologie**

1 ampoule buvable 2 fois par jour.

Ne pas dépasser 2 ampoules par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN

### **Mode d'administration**

Voie orale.

### **Fréquence d'administration**

1 ampoule buvable matin et soir.

### **Durée du traitement**

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUEE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE.

### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Sans objet.

### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- nausées, vomissements;
- prurit;
- maux de tête;
- atteintes exceptionnelles du foie.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Date de péremption**

Ne pas utiliser ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

### **Conditions de conservation**

Pas de précautions particulières de conservation.

### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## [6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES](#)

### [Liste complète des substances actives et des excipients](#)

**Que contient ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule ?**

#### **Les substances actives sont:**

Extrait fluide de mélilot .....	1,0 g
Quantité correspondant en dérivés coumariniques .....	0,005 g
Rutoside* .....	0,250 g

Pour une ampoule.

\*: Rutine hydrosoluble

#### **Les autres composants sont:**

Alcool, eau purifiée.

### [Forme pharmaceutique et contenu](#)

**Qu'est-ce que ESBERIVEN FORT, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en ampoule. Boîte de 20.

[Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent](#)

#### [Titulaire](#)

AMDIPHARM LIMITED

Temple Chambers

3, Burlington Road

DUBLIN 4

IRLANDE

#### [Exploitant](#)

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

76, avenue du Midi

63802 COURNON D'AUVERGNE

#### [Fabricant](#)

PHARMATIS

ZA Est n°1

60190 ESTREES-SAINT-DENIS.

[Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen](#)

Sans objet.

[Date d'approbation de la notice](#)

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.**

[AMM sous circonstances exceptionnelles](#)

Sans objet.

[Informations Internet](#)

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

[Informations réservées aux professionnels de santé](#)

Sans objet.

[Autres](#)

Sans objet.