

[NOTICE](#)

ANSM - Mis à jour le : 23/08/2011

[Dénomination du médicament](#)

DULCIPHAK, collyre en solution

Méthylsilanetriol, salicylate de sodium, acide parahydroxycinnamique

[Encadré](#)

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

[Sommaire notice](#)

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DULCIPHAK, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DULCIPHAK, collyre en solution ?
3. COMMENT UTILISER DULCIPHAK, collyre en solution ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DULCIPHAK, collyre en solution ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

[1. QU'EST-CE QUE DULCIPHAK, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?](#)

[Classe pharmacothérapeutique](#)

C'est un médicament de l'œil.

[Indications thérapeutiques](#)

Ce médicament est indiqué en traitement d'appoint des opacifications du cristallin.

[2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DULCIPHAK, collyre en solution](#)

?

[Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament](#)

Sans objet.

[Contre-indications](#)

N'utilisez jamais DULCIPHAK, collyre en solution:

- si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans DULCIPHAK collyre.

[Précautions d'emploi : mises en garde spéciales](#)

Faites attention avec DULCIPHAK, collyre en solution:

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques.

[Interactions avec d'autres médicaments](#)

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous devez mettre un autre collyre, espacez les 2 administrations de 15 minutes.

[Interactions avec les aliments et les boissons](#)

Sans objet.

[Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives](#)

Sans objet.

[Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement](#)

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

[Sportifs](#)

Sans objet.

[Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines](#)

Sans objet.

[Liste des excipients à effet notoire](#)

Informations importantes concernant certains composants de DULCIPHAK, collyre en solution

Excipient à effet notoire: parahydroxybenzoate de méthyle (E 218).

[3. COMMENT UTILISER DULCIPHAK, collyre en solution ?](#)

[Instructions pour un bon usage](#)

Sans objet.

[Posologie, Mode et/ou voie\(s\) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement](#)

Posologie:

Respectez toujours la posologie de votre médecin. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est d'une goutte de collyre par œil malade, 3 fois par jour (matin, midi et soir).

Mode d'administration

A utiliser dans les yeux seulement.

Se laver soigneusement les mains.

N'utilisez pas le flacon si le scellé d'inviolabilité situé sur le col du flacon a été endommagé avant sa première utilisation.

Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.

Instiller 1 goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival inférieur de l'œil ou des yeux malades en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.

Visser le bouchon du flacon après utilisation.

Durée du traitement

Si les troubles s'aggravent, consulter un médecin.

[Symptômes et instructions en cas de surdosage](#)

Si vous avez utilisé plus de DULCIPHAK, collyre en solution que vous n'auriez dû:

Demandez l'avis de votre médecin ou votre pharmacien.

[Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses](#)

Si vous oubliez d'utiliser DULCIPHAK, collyre en solution:

Ne pas utiliser de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié d'utiliser mais poursuivez simplement votre traitement.

[Risque de syndrome de sevrage](#)

Si vous arrêtez d'utiliser DULCIPHAK, collyre en solution:

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin

ou à votre pharmacien.

[4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?](#)

[Description des effets indésirables](#)

Comme tous les médicaments, DULCIPHAK, collyre en solution est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Les effets indésirables suivants sont de fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles):

[Affections oculaires](#)

Effet transitoire après instillation du collyre: picotements oculaires, sensation de brûlures oculaires, démangeaisons oculaires, rougeur de l'œil.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

[5. COMMENT CONSERVER DULCIPHAK, collyre en solution ?](#)

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

[Date de péremption](#)

Ne pas utiliser DULCIPHAK, collyre en solution après la date de péremption mentionnée sur le flacon après EXP.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

[Conditions de conservation](#)

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 30 jours.

[Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration](#)

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

[6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES](#)

[Liste complète des substances actives et des excipients](#)

Que contient DULCIPHAK, collyre en solution ?

Les substances actives sont: le méthylsilanétriol, le salicylate de sodium, l'acide parahydroxycinnamique

Les autres composants sont: le parahydroxybenzoate de méthyle (E218), le chlorure de sodium, l'hypophosphite de sodium, l'hydroxyde de sodium, l'eau purifiée.

[Forme pharmaceutique et contenu](#)

Qu'est-ce que DULCIPHAK, collyre en solution et contenu de l'emballage extérieur ?

C'est un collyre en solution en flacon de 10 ml.

[Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent](#)

[Titulaire](#)

ALLERGAN FRANCE
12, Place de la Defense
92400 COURBEVOIE

[Exploitant](#)

ALLERGAN FRANCE
12, place de la Defense
92400 COURBEVOIE

[Fabricant](#)

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
WESTPORT
CO.MAYO
IRLANDE

[Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen](#)

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:

Conformément à la réglementation en vigueur.

[Date d'approbation de la notice](#)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

[AMM sous circonstances exceptionnelles](#)

Sans objet.

[Informations Internet](#)

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

[Informations réservées aux professionnels de santé](#)

Sans objet.

[Autres](#)

Sans objet.