

## [NOTICE](#)

ANSM - Mis à jour le : 20/09/2012

### [Dénomination du médicament](#)

CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique

### [Encadré](#)

[Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.](#)

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### [Sommaire notice](#)

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique ?
3. COMMENT PRENDRE CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

[1. QU'EST-CE QUE CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?](#)

### [Classe pharmacothérapeutique](#)

Classe pharmacothérapeutique : CALCIUM / ELEMENT MINERAL

(A: appareil digestif et métabolisme)

### Indications thérapeutiques

Ce médicament contient du calcium.

Il est préconisé:

- en cas de carences en calcium suite à une augmentation des besoins (croissance, grossesse, allaitement),
- en traitement d'appoint des décalcifications osseuses chez le sujet âgé, ou suite à la ménopause, à une corticothérapie, ou une immobilisation prolongée après reprise de la mobilité.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CALCIFORTE 500 mg. solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique ?

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

##### Sans objet.

##### Contre-indications

**N'utilisez jamais CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique dans les cas suivants:**

- antécédent d'allergie à l'un des constituants,
- hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang),
- hypercalciurie (élimination exagérée de calcium dans les urines),
- lithiase calcique (calcul rénal) - calcifications tissulaires,
- immobilisation prolongée s'accompagnant d'hypercalcémie et/ou d'hypercalciurie: le calcium ne doit être administré qu'à la reprise de la mobilité.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

##### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

**Faites attention avec CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique :**

##### **Mises en garde spéciales**

Des apports excessifs en calcium peuvent être dangereux. NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT SANS AVIS MEDICAL.

##### **Précautions d'emploi**

Utiliser ce médicament *AVEC PRECAUTION* en cas de traitement prolongé ou d'insuffisance rénale: il est nécessaire de faire contrôler le taux de calcium dans les urines et dans le sang.

*EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE*

PHARMACIEN.

[Interactions avec d'autres médicaments](#)

**[Prise d'autres médicaments](#)**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

[Interactions avec les aliments et les boissons](#)

[Sans objet.](#)

[Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives](#)

[Sans objet.](#)

[Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement](#)

**Grossesse et Allaitement**

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

[Sportifs](#)

[Sans objet.](#)

[Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines](#)

[Sans objet.](#)

[Liste des excipients à effet notoire](#)

[Sans objet.](#)

[3. COMMENT PRENDRE CALCIFORTE 500 mg. solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique ?](#)

[Instructions pour un bon usage](#)

[Sans objet.](#)

[Posologie, Mode et/ou voie\(s\) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement](#)

**Posologie**

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

Adultes et enfant de plus de 10 ans: 2 ampoules par jour.

Enfant de 6 à 10 ans: 1 ampoule par jour.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE:

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

### **Mode et voie d'administration**

Voie orale.

La présence de levure entraînant un dépôt, secouer l'ampoule avant de l'ouvrir, puis diluer le contenu dans un verre d'eau. A prendre de préférence au cours des repas.

[Symptômes et instructions en cas de surdosage](#)

[Sans objet.](#)

[Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses](#)

[Sans objet.](#)

[Risque de syndrome de sevrage](#)

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

[Description des effets indésirables](#)

Comme tous les médicaments, CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Troubles digestifs de type constipation, flatulence, nausées.
- En cas de traitement prolongé à fortes doses: risque de modification du taux de calcium dans le sang ou les urines.

[Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.](#)

### **5. COMMENT CONSERVER CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

[Date de péremption](#)

Ne pas utiliser CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

## [Conditions de conservation](#)

A conserver à une température inférieure à 25°C.

## [Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration](#)

[Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.](#)

## [6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES](#)

### [Liste complète des substances actives et des excipients](#)

**Que contient CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique ?**

#### **Les substances actives sont:**

Gluconate de calcium .....	1,0500 g
Lactate de calcium pentahydraté .....	1,2800 g
Glucoheptonate de calcium .....	0,9300 g
Chlorure de calcium .....	0,5440 g
Levure ( <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ) .....	0,0300 g

Pour une ampoule de 10 ml.

#### **Les autres composants sont:**

Acide lactique, saccharine sodique, glycyrrhizinate d'ammonium, arôme citron-mirabelle, cyclamate de sodium, eau.

### [Forme pharmaceutique et contenu](#)

**Qu'est-ce que CALCIFORTE 500 mg, solution buvable en ampoule édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en ampoule de 10 ml, boîte de 30.

[Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent](#)

#### [Titulaire](#)

Laboratoires GRIMBERG

19, rue Poliveau

75005 Paris

#### [Exploitant](#)

Laboratoires SEROZYM

30, rue Armand Sylvestre

92400 COURBEVOIE

[Fabricant](#)

DELPHARM TOURS

La Baraudiere

37170 CHAMBRAY LES TOURS

[Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen](#)

[Sans objet.](#)

[Date d'approbation de la notice](#)

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.**

[AMM sous circonstances exceptionnelles](#)

[Sans objet.](#)

[Informations Internet](#)

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

[Informations réservées aux professionnels de santé](#)

[Sans objet.](#)

[Autres](#)

Sans objet.