

## [NOTICE](#)

ANSM - Mis à jour le : 04/06/2013

### [Dénomination du médicament](#)

SEBIPROX 1,5 %, shampooing

### **Ciclopirox olamine**

### [Encadré](#)

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Ce médicament est disponible sans ordonnance. Toutefois, pour en obtenir les meilleurs résultats, vous devez toujours utiliser le shampooing Sebiprox avec précaution.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 4 semaines, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### [Sommaire notice](#)

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE SEBIPROX 1,5 %, shampooing ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SEBIPROX 1,5 %, shampooing ?
3. COMMENT UTILISER SEBIPROX 1,5 %, shampooing ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER SEBIPROX 1,5 %, shampooing ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### [1. QU'EST-CE QUE SEBIPROX 1,5 %, shampooing ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?](#)

#### [Classe pharmacothérapeutique](#)

Le shampooing Sebiprox contient un composant appelé ciclopirox olamine. Il appartient à un groupe de médicaments appelé « antifongiques ».

## [Indications thérapeutiques](#)

Le shampooing Sebiprox est préconisé pour les cuirs chevelus squameux, rouges et qui démangent (appelé dermatite séborrhéique).

## [2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SEBIPROX 1,5 %, shampooing ?](#)

### [Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament](#)

Sans objet.

### [Contre-indications](#)

#### **N'utilisez jamais SEBIPROX 1,5 %, shampooing:**

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la ciclopirox olamine ou à l'un des autres composants contenus dans le shampooing Sebiprox ([listés au paragraphe 6](#)).

Si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser le shampooing Sebiprox.

### [Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales](#)

#### [Faites attention avec SEBIPROX 1,5 %, shampooing :](#)

- Le shampooing SEBIPROX est réservé à l'usage externe uniquement.
- Le shampooing SEBIPROX peut, dans de rares cas, **modifier la couleur de vos cheveux** si vous avez les cheveux gris, blancs ou abîmés par des agents chimiques (par exemple en raison des colorations capillaires). Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser le shampooing SEBIPROX si vous êtes dans ce cas. Votre médecin ou votre pharmacien vous indiquera si SEBIPROX shampooing peut vous convenir.
- SEBIPROX n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 12 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas connu dans cette tranche d'âge.
- Essayez d'éviter le contact de SEBIPROX shampooing avec vos yeux. Il peut provoquer des picotements et des irritations. En cas de contact accidentel avec vos yeux, **rincer la zone touchée** à l'eau.

### [Interactions avec d'autres médicaments](#)

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### [Interactions avec les aliments et les boissons](#)

Sans objet.

### [Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives](#)

Sans objet.

### [Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement](#)

## [Grossesse et allaitement](#)

Il n'y a aucune information concernant la tolérance de SEBIPROX shampooing chez la femme enceinte.

- **Si vous êtes enceinte** ou si vous planifiez de le devenir, **parlez-en à votre médecin.**
- **Si vous tombez enceinte pendant le traitement** avec SEBIPROX shampooing, parlez-en à votre médecin.

Il n'a pas été déterminé si les ingrédients du SEBIPROX shampooing peuvent être excrétés dans le lait maternel. Si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser SEBIPROX shampooing.

Si vous utilisez SEBIPROX shampooing pendant la période d'allaitement, assurez vous avant de commencer l'allaitement de votre enfant que toutes traces de SEBIPROX shampooing aient été entièrement rincées au niveau de votre poitrine après le bain/la douche.

## [Sportifs](#)

Sans objet.

## [Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines](#)

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines:**

Il n'y a pas de restrictions à la conduite ou à l'utilisation de machines lors du traitement avec le shampooing Sebiprox.

## [Liste des excipients à effet notoire](#)

### **Informations importantes concernant certains composants de SEBIPROX 1,5 %, shampooing**

Le shampooing Sebiprox contient du dipropylène glycol (contenu dans le parfum AF 17050). Ceci peut provoquer une irritation de la peau chez certaines personnes.

## [3. COMMENT UTILISER SEBIPROX 1,5 %, shampooing ?](#)

### [Instructions pour un bon usage](#)

Sans objet.

### [Posologie, Mode et/ou voie\(s\) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement](#)

#### [Posologie](#)

- Utilisez le shampooing SEBIPROX 2 à 3 fois par semaine pendant 4 semaines.
- Utilisez le shampooing SEBIPROX uniquement sur vos cheveux, sur le cuir chevelu et sur les zones adjacentes si elles le nécessitent.
- Vous pouvez utiliser un shampooing doux les jours où vous n'utilisez pas le shampooing SEBIPROX.

Comment utiliser SEBIPROX shampooing

1. Mouillez les cheveux.

2. Utilisez suffisamment de shampooing SEBIPROX de manière à ce qu'il couvre votre cuir chevelu et vos cheveux et les zones adjacentes, si elles sont également touchées.

3. Massez le cuir chevelu et les zones adjacentes si nécessaire, en utilisant le bout de vos doigts.

4. Rincez votre cuir chevelu et vos cheveux abondamment.

5. Répétez l'opération de l'étape 2 à l'étape 4. SEBIPROX shampooing doit être en contact avec votre cuir chevelu pendant un temps de trois à cinq minutes au total pour les deux applications.

Veillez à ne pas mettre de shampooing SEBIPROX dans vos yeux. Si cela arrive, bien rincer à l'eau claire.

#### [Symptômes et instructions en cas de surdosage](#)

#### [Si vous avalez accidentellement du SEBIPROX 1,5 %, shampooing :](#)

Les ingrédients de SEBIPROX shampooing ne sont pas connus comme étant nocifs s'ils sont avalés en petites quantités. Si vous avez accidentellement du SEBIPROX shampooing dans votre bouche, rincez immédiatement avec de l'eau. Si vous avalez accidentellement une grande quantité de SEBIPROX shampooing, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### [Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses](#)

Sans objet.

#### [Risque de syndrome de sevrage](#)

Sans objet.

### [4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?](#)

#### [Description des effets indésirables](#)

[Comme tous les médicaments, SEBIPROX 1,5%, shampooing est susceptible d'avoir des effets indésirables bien que tout le monde n'y soit pas sujet.](#)

Les effets indésirables peuvent survenir à différentes fréquences, qui sont définies de la manière suivante :

- très fréquent : peut affecter plus d'1 personne sur 10.
- fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10.
- indéterminé : fréquence qui ne peut pas être estimée à partir des données disponibles.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec le shampooing SEBIPROX :

#### **Très fréquent :**

- irritation de la peau\*,
- démangeaison\*.

#### **Fréquent :**

- éruption cutanée\*,

- sensation de brûlure,
- rougeurs au site d'application\*.

**Fréquence indéterminée :**

- réaction allergique,
- desquamation de la peau\*,
- eczéma (éruption cutanée avec démangeaisons)\*,
- chute de cheveux\*,
- changements de la couleur des cheveux.

Certains de ces effets (signalés par une “\*\*”) peuvent aussi être des symptômes de la maladie que vous traitez. Toutefois, si vous remarquez ces effets indésirables pour la première fois après avoir utilisé le shampooing SEBIPROX, ou si l'irritation, la rougeur ou la démangeaison s'aggravent, arrêtez l'utilisation du shampooing SEBIPROX et informez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

[5. COMMENT CONSERVER SEBIPROX 1,5 %, shampooing ?](#)

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

[Date de péremption](#)

Ne pas utiliser SEBIPROX 1,5 %, shampooing après la date de péremption mentionnée sur le flacon et sur le conditionnement extérieur. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

[Conditions de conservation](#)

Il n'existe aucune précaution particulière concernant la conservation.

[Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration](#)

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

[6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES](#)

[Liste complète des substances actives et des excipients](#)

**Que contient SEBIPROX 1,5 %, shampooing ?**

**La substance active est:** la ciclopiroxolamine 1,5 g pour 100 g.

**Les autres composants sont:**

Lauril éther sulfate de sodium à 70 %, cocamidopropylbétaïne, phosphate disodique dodécahydraté, acide citrique monohydraté, diéthanolamide d'acide gras d'huile de coco, hexylène glycol, alcool oléique, polysorbate 80, polyquaternium 10, parfum AF17050 (contenant du dipropylène glycol), hydroxyde de sodium, eau purifiée.

## [Forme pharmaceutique et contenu](#)

### **Qu'est-ce que SEBIPROX 1,5 %, shampooing et contenu de l'emballage extérieur ?**

Le shampooing Sebiprox est un shampooing de couleur jaune paille à orangé présenté en flacons de 60 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 250 ml, 350 ml ou 500 ml. Il se peut que tous les formats de flacon ne soient pas commercialisés.

## [Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent](#)

### [Titulaire](#)

STIEFEL LABORATORIES (IRELAND) LTD

FINISKLIN BUSINESS PARK

SLIGO

IRLANDE

### [Exploitant](#)

LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

100, route de Versailles

78163 MARLY LE ROI CEDEX

### [Fabricant](#)

#### [STIEFEL LABORATORIES IRELAND LTD](#)

FINISKLIN BUSINESS PARK

SLIGO

IRLANDE

ou

ASPEN BAD OLDESLOE GMBH

INDUSTRIESTRASSE 32-36

23843 BAD OLDESLOE

Allemagne

ou

**FAMAR NEDERLAND B.V.**

Industrieweg 1

5531 AD BLADEL

PAYS BAS

[Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen](#)

**Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants:**

Conformément à la réglementation en vigueur.

[Date d'approbation de la notice](#)

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.**

[AMM sous circonstances exceptionnelles](#)

Sans objet.

[Informations Internet](#)

[Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM \(France\).](#)

[Informations réservées aux professionnels de santé](#)

Sans objet.

[Autres](#)

Sans objet.